

診療グループ名
レジメンセット名称

乳がん
1 EC

投与規定
インターバル日数 (21) 日
レジメン基準日 day (1)

通しNo	癌	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5-21)
		大塚生食注	100 mL		ラインキープ用		●				休薬
No.1		パロノセトロン点滴静注バッグ0.75m	0.75 mg	点滴静注	メイン①	30min	●				
		デキサート注射液	9.9 mg		開始時No.5アプレピタント服用		●				
No.2		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン②	全開	●				
	◆	エピルビンシリン塩酸塩注射液	75 mg/m2				●				
No.3		大塚生食注	100 mL	点滴静注	メイン③	30min	●				
	◆	注射用エンドキサン	600 mg/m2				●				
No.4		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン④	全開	●				
No.5		アプレピタントカプセル125mg内服	125 mg	内服	メイン①開始時服用		●				
No.6		アプレピタントカプセル80mg内服	80 mg	内服	朝食後			●	●		
No.7		デカドロン錠4mg内服	8 mg	内服	朝夕食後			●	●	●	

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo		薬品名・規格	標準値	上限値
No.2	◆	エピルビンシリン塩酸塩注射液	75 mg/m2	≤900mg/m ² (累積)
No.3	◆	注射用エンドキサン	600 mg/m2	

投与可能条件(初回)

検査値	基準
WBC	3 × 10 ³ /L以上
好中球	1.5 × 10 ³ /L以上
血小板	100 × 10 ³ /L以上
左室駆出率(LVEF)	55%以上

減量基準

検査値	基準