最終更新:2022/1/4

診療グループ名　乳がん
レジメンセット名称　3 Cape+HER

投与規定
インターバル日数　(21)日
レジメン基準日　day(1)

通しNo	癌	薬品名･規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間･速度	day(1)	day(2-14)	day(15)	day(16-21)
		大塚生食注	100 mL		ラインキープ用		●			休薬
No.1		大塚生食注	250 mL	点滴静注	メイン①	90min(初回) 60min(2回目以降) ※30minまで短縮可	●			
		注射用水	40 mL							
	◆	トラスツズマブ注射用	(初回)8 mg/kg				●			
			(2回目以降)6 mg/kg							
No.2		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン②	全開	●			
No.3	◆	カペシタビン錠300	2500 mg/m2/day	内服	朝夕食後		夕	朝夕	朝	

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo		薬品名･規格	標準値	上限値
No.2	◆	トラスツズマブ注射用	(初回)8 mg/kg	
			(2回目以降)6 mg/kg	
No.4	◆	カペシタビン錠300	2500 mg/m2/day	

投与可能条件(初回)

検査値	基準

減量基準

検査値	基準

カペシタビン用量(1日量)

体表面積 (m2)	用量(mg/日)
1.33未満	3000
1.33以上1.57未満	3600
1.57以上1.81未満	4200
1.81以上	4800