

診療グループ名
レジメンセット名称

大腸がん
8 FOLFIRI+Pmab

投与規定

インターバル日数 (14)日
レジメン基準日 day(1)

| 通しNo | 癌 | 薬品名・規格 | 投与量 | 手技 | 投与ルート | 点滴時間・速度 | 器具 | day(1) | day(2) | day(3) | day(4-14) |
|------|---|-----------------------------|------------|------|------------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 大塚生食注 | 100 mL | | ラインキープ用 | | | ● | | | 休業 |
| No.1 | | 大塚生食注 | 100 mL | 点滴静注 | メイン① | 30min | | ● | | | |
| | | グラニセトロン静注液3mg | 3 mg | | | | | ● | | | |
| | | デキサート注射液 | 3.3 mg | | | | | ● | | | |
| No.2 | | 大塚生食注 | 100 mL | 点滴静注 | メイン② | 60min | インラインフィルター (0.2ミクロン) | ● | | | |
| | ◆ | ベクティビックス点滴静注100mg | 6 mg/kg | | 開始時No.7アプレピタント服用 | | | ● | | | |
| | | *全量100mLとなるように調製 | | | | | | | | | |
| | | *1回1000mgを超える場合は全量を150mLとする | | | | | | | | | |
| No.3 | | 大塚糖液5% | 500 mL | 点滴静注 | メイン③ | 120min | | ● | | | |
| | | レボホリナート点滴静注用 | 200 mg/m2 | | メイン②終了後 | | | ● | | | |
| No.4 | | 大塚糖液5% | 250 mL | 点滴静注 | 側管① | 120min | | ● | | | |
| | ◆ | イリノテカン塩酸塩点滴静注液 | 150 mg/m2 | | メイン③と同時に | | | ● | | | |
| No.5 | | 大塚生食注 | 50 mL | 静注 | メイン④ | 全開 | | ● | | | |
| | ◆ | フルオロウラシル注 | 400 mg/m2 | | メイン③終了後 | | | ● | | | |
| No.6 | | ソルデム3A輸液 | 500 mL | 持続静注 | メイン⑤ | 46hr 13mL/hr(*) | | ● | | | |
| | | ヘパリンNa注5千単位/5mL | 5 mL | | メイン④終了後 | | | ● | | | |
| | ◆ | フルオロウラシル注 | 2400 mg/m2 | | | | | ● | | | |
| | | *全量500mLとなるように調製 | | | | | | | | | |
| No.7 | | アプレピタントカプセル125mg内服 | 125 mg | 内服 | メイン②開始時服用 | | | ● | | | |
| No.8 | | アプレピタントカプセル80mg内服 | 80 mg | 内服 | 朝食後 | | | | ● | ● | |
| No.9 | | デカドロン錠4mg内服 | 4 mg | 内服 | 朝食後 | | | | ● | ● | |

上記表にて設定する抗がん剤について

| 通しNo | 薬品名・規格 | 標準値 | 上限値 |
|------|------------------|------------|-----|
| No.2 | ◆ ベクティビックス点滴静注 | 6 mg/kg | |
| No.3 | レボホリナート点滴静注用 | 200 mg/m2 | |
| No.4 | ◆ イリノテカン塩酸塩点滴静注液 | 150 mg/m2 | |
| No.5 | ◆ フルオロウラシル注 | 400 mg/m2 | |
| No.6 | ◆ フルオロウラシル注 | 2400 mg/m2 | |
| | | | |
| | | | |

* 投与速度は理論上11mL/hrとなるが、実際は13mL/hrにて46時間投与となることが検証されたため
投与可能条件

| 検査値 | 基準 |
|-----|----|
| | |
| | |
| | |

減量基準

| 検査値 | 基準 |
|-----|----|
| | |
| | |
| | |

診療グループ名
レジメンセット名称

大腸がん
8 FOLFIRI+Pmab 【インフューザー】

投与規定
インターバル日数 (14)日
レジメン基準日 day(1)

| 通しNo | 癌 | 薬品名・規格 | 投与量 | 手技 | 投与ルート | 点滴時間・速度 | 器具 | day(1) | day(2) | day(3) | day(4-14) |
|------|---|---|------------|------|------------------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 大塚生食注 | 100 mL | | ラインキープ用 | | | ● | | | 休業 |
| No.1 | | 大塚生食注 | 100 mL | 点滴静注 | メイン① | 30min | | ● | | | |
| | | グラニセトロン静注液3mg | 3 mg | | ● | | | | | | |
| | | デキサート注射液 | 3.3 mg | | ● | | | | | | |
| No.2 | | 大塚生食注 | 100 mL | 点滴静注 | メイン② | 60min | インラインフィルター (0.2ミクロン) | ● | | | |
| | | ◆ベクティビックス点滴静注100mg | 6 mg/kg | | 開始時No.7アブレピタント服用 | | | ● | | | |
| | | *全量100mLとなるように調製 *1回1000mgを超える場合は全量を150mLとする | | | | | | | | | |
| No.3 | | 大塚糖液5% | 500 mL | 点滴静注 | メイン③ | 120min | | ● | | | |
| | | レボホリナート点滴静注用 | 200 mg/m2 | | メイン②終了後 | | | ● | | | |
| No.4 | | 大塚糖液5% | 250 mL | 点滴静注 | 側管① | 120min | | ● | | | |
| | | ◆イリノテカン塩酸塩点滴静注液 | 150 mg/m2 | | メイン③と同時に | | | ● | | | |
| No.5 | | 大塚生食注 | 50 mL | 静注 | メイン④ | 全開 | | ● | | | |
| | | ◆フルオロウラシル注 | 400 mg/m2 | | メイン③終了後 | | | ● | | | |
| No.6 | | ヘパリンNa注5千単位/5mL | 5 mL | 持続静注 | メイン⑤ | 46hr | ハクスターインフューザー SV2 | ● | | | |
| | | フルオロウラシル注 | 2400 mg/m2 | | メイン④終了後 | | | ● | | | |
| | | ◆大塚生食注 | ad.100 mL | | | | | ● | | | |
| No.7 | | アブレピタントカプセル125mg内服 | 125 mg | 内服 | メイン②開始時服用 | | | ● | | | |
| No.8 | | アブレピタントカプセル80mg内服 | 80 mg | 内服 | 朝食後 | | | | ● | ● | |
| No.9 | | デカドロン錠4mg内服 | 4 mg | 内服 | 朝食後 | | | | ● | ● | |

上記表にて設定する抗がん剤について

| 通しNo | 薬品名・規格 | 標準値 | 上限値 |
|------|-----------------|------------|-----|
| No.2 | ◆ベクティビックス点滴静注 | 6 mg/kg | |
| No.3 | レボホリナート点滴静注用 | 200 mg/m2 | |
| No.4 | ◆イリノテカン塩酸塩点滴静注液 | 150 mg/m2 | |
| No.5 | ◆フルオロウラシル注 | 400 mg/m2 | |
| No.6 | ◆フルオロウラシル注 | 2400 mg/m2 | |

投与可能条件

| 検査値 | 基準 |
|-----|----|
| | |
| | |

減量基準

| 検査値 | 基準 |
|-----|----|
| | |
| | |