

診療グループ名  
レジメンセット名称

大腸がん  
10 CapeOX+Bmab

投与規定

インターバル日数 (21)日  
レジメン基準日 day(1)

通しNo	癌	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2-3)	day(4-14)	day(15)	day(16-21)	
		大塚生食注	100 mL		ラインキープ用		●				休業	
No.1		大塚生食注	100 mL	点滴静注	メイン①	30min	●					
		グラニセトロン静注液3mg	3 mg					●				
		デキサート注射液	3.3 mg					●				
		ポラミン注5mg	5 mg					●				
No.2		大塚生食注	100 mL	点滴静注	メイン②	90min(初回)	●					
	◆	ペバシズマブBS点滴静注	7.5 mg/kg		開始時No.6アプレピタント服用	60min(2回目以降)	●					
No.3		大塚糖液5%	500 mL	点滴静注	メイン③	120min	●					
	◆	オキサリプラチン点滴静注液 *全量500mLとなるように調製	130 mg/m2					●				
No.4		大塚生食注	50 mL	静注	メイン④	15min	●					
No.5	◆	カペシタビン錠300 * 14日間服用後、7日間休業	2000 mg/m2/day	内服	朝夕食後		夕	朝夕	朝夕	朝		
No.6		アプレピタントカプセル125mg内服	125 mg	内服	メイン②開始時服用		●					
No.7		アプレピタントカプセル80mg内服	80 mg	内服	朝食後			●				
No.8		デカドロン錠4mg内服	4 mg	内服	朝食後			●				

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
No.2	◆ ペバシズマブBS点滴静注	7.5 mg/kg	
No.3	◆ オキサリプラチン点滴静注液	130 mg/m2	
No.5	◆ カペシタビン錠300	2000 mg/m2/day	

投与可能条件(初回)

検査値	基準
好中球	
血小板	
術後4weeks以上	
OPE前8weeks前中止	
BP:160/100mmHg未満	

カペシタビン用量(1日量)

体表面積(m2)	用量(mg/日)
1.36未満	2400
1.36以上1.66未満	3000
1.66以上1.96未満	3600
1.96以上	4200