

診療グループ名 大腸がん  
レジメンセット名称 35 Cape+Bmab

投与規定

インターバル日数 ( 21 ) 日  
レジメン基準日 day( 1 )

通しNo	癌	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	day( 1 )	day( 2-14 )	day( 15 )	day( 16-21 )
		大塚生食注	100 mL		ラインキープ用		●			休薬
No.1		大塚生食注	100 mL	点滴静注	メイン①	90min(初回)	●			
	◆	ベバシズマブBS点滴静注	7.5 mg/kg			60min(2回目以降)	●			
No.2		大塚生食注	50 mL	静注	メイン②	全開	●			
No.3	◆	カペシタビン錠300	2000 mg/m <sup>2</sup> /day	内服	朝夕食後		夕	朝夕	朝	
		* 14日間服用後、7日間休薬								

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
No.1	◆ ベバシズマブBS点滴静注	7.5 mg/kg	
No.3	◆ カペシタビン錠300	2000 mg/m <sup>2</sup> /day	

投与可能条件(初回)

検査値	基準
好中球	
血小板	
術後4weeks以上	
OPE前8weeks前中止	
BP:160/100mmHg未満	

減量基準

検査値	基準

カペシタビン用量(1日量)

体表面積(m <sup>2</sup> )	用量(mg/日)
1.36未満	2400
1.36以上1.66未満	3000
1.66以上1.96未満	3600
1.96以上	4200