

診療グループ名
レジメンセット名称

大腸がん
102 FTD/TPI+Bmab

投与規定

インターバル日数 (28) 日
レジメン基準日 day(1)

通しNo	癌	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2-14)	day(15)	day(16-28)
		大塚生食注	100 mL		ラインキープ用		●		●	休薬
No.1		大塚生食注	100 mL	点滴静注	メイン①	60min	●		●	
	◆	ベバシズマブBS点滴静注	5 mg/kg				●		●	
No.2		大塚生食注	50 mL	静注	メイン②	全開	●		●	
No.3	◆	ロンサーフ配合錠	70 mg/m2	内服	朝夕食後		* 1週目: day1夕～day6朝服用 day6夕～day8朝休薬 * 2週目: day8夕～day13朝服用 day13夕～休薬			
		* 5日間服用後、2日間休薬 上記を2回繰り返した後14日間休薬								

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
No.1	◆ ベバシズマブBS点滴静注	5 mg/kg	
No.3	◆ ロンサーフ配合錠	70 mg/m2	

投与可能条件(初回)

検査値	基準
好中球	1,500/mm ³
血小板	75,000/mm ³
術後4weeks以上	
OPE8weeks前中止	
BP:<160/100mmHg	

減量基準

検査値	基準
好中球数	500/mm ³ 未満
血小板数	5万/mm ³ 未満

体表面積(m2)	初回基準量(FTD相当量)
<1.07未満	35mg/回(70mg/日)
1.07以上～1.23未満	40mg/回(80mg/日)
1.23以上～1.38未満	45mg/回(90mg/日)
1.38以上～1.53未満	50mg/回(100mg/日)
1.53以上～1.69未満	55mg/回(110mg/日)
1.69以上～1.84未満	60mg/回(120mg/日)
1.84以上～1.99未満	65mg/回(130mg/日)
1.99以上～2.15未満	70mg/回(140mg/日)
2.15以上	75mg/回(150mg/日)