

診療グループ名  
レジメンセット名称

胃がん  
76 SOX(胃がん)

投与規定

インターバル日数( 21 )日  
レジメン基準日 day( 1 )

通しNo	癌	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	day( 1 )	day( 2 )	day( 3 )	day(4-14 )	day(15)	day(16-21)
		大塚生食注	100 mL	点滴静注	ラインキープ用		●					
No.1		大塚生食注	100 mL	点滴静注	メイン①	30min	●					休薬
		グラニセトロン静注液3mg	3 mg		開始時No.5アプレピタント服用		●					
		デキサート注射液	3.3 mg		●							
		ポララミン注射液	5 mg		●							
No.2		大塚糖液5%	500 mL	点滴静注	メイン②	120min	●					
	◆	オキサリプラチン点滴静注液	100 mg/m2		全量500mLとする		●					
No.3		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン③	15min	●					
No.4	◆	エスワン(後発品)(剤形は問わない) *14日間服用後、7日間休薬	(投与量は下表を参照)	内服	朝夕食後		夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝	
No.5		アプレピタントカプセル125mg内服	125 mg	内服	メイン①開始時服用		●					
No.6		アプレピタントカプセル80mg内服	80 mg	内服	朝食後			●	●			
No.7		デカドロン錠4mg内服	4 mg	内服	朝食後			●	●			

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
No.2	◆ オキサリプラチン点滴静注液	100 mg/m2	
No.4	◆ エスワン(後発品)		

投与可能条件(初回)

検査値	基準
好中球	1,500以上
血小板	75,000以上

エスワン(後発品)の用量(1日量)

体表面積 (m <sup>2</sup> )	1日用量(mg/日)
1.25未満	80
1.25以上1.5未満	100
1.5以上	120

減量基準

検査値	基準