

診療グループ名
レジメンセット名称

肺癌
30 PEM(NSCLC)

投与規定

インターバル日数 (21~28) 日
レジメン基準日 day(1)

通しNo	癌	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2-21or28)														
		大塚生食注	100 mL		ラインキープ用		●	休業														
No.1		パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg	0.75 mg	点滴静注	メイン①	30min	●															
		デキサート注射液	9.9 mg				●															
No.2		大塚生食注	100 mL	点滴静注	メイン②	10min	●															
	◆	ペムトレキセド点滴静注液	500 mg/m2				●															
No.3		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン③	全開	●															

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
No.2	◆ ペムトレキセド点滴静注液	500 mg/m2	

投与可能条件(初回)

検査値	基準
好中球	
血小板	

減量基準

検査値	基準

<プレメディケーション>

○葉酸
本剤初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mg(フォリアミン錠あるいはパンピタン末など)を連日経口投与する。なお、本剤の投与を中止又は終了する場合には、本剤最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。

○ビタミンB12
本剤初回投与の少なくとも7日前に、ビタミンB12(メコバラミン注など)として1回1mgを筋肉内投与する。その後、本剤投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。