

診療グループ名
レジメンセット名称

乳がん
104 dose-dense EC

投与規定

インターバル日数 (14)日
レジメン基準日 day(1)

通しNo	癌	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5-14)
		大塚生食注	100 mL		ラインキープ用		●				休薬
No.1		パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg	0.75 mg	点滴静注	メイン①	30min	●				
		デキサート注射液	9.9 mg		開始時No.6アプレピタント服用			●			
No.2		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン②	全開	●				
	◆	エピルピシン塩酸塩注射液	90 mg/m2				●				
No.3		大塚生食注	100 mL	点滴静注	メイン③	30min	●				
	◆	注射用エンドキサン	600 mg/m2				●				
No.4		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン④	全開	●				
No.5		ジーラスタ皮下注	3.6 mg	皮下注射		※day2or3or4		●	(●)	(●)	
No.6		アプレピタントカプセル125mg内服	125 mg	内服	メイン①開始時服用		●				
No.7		アプレピタントカプセル80mg内服	80 mg	内服	朝食後			●	●		
No.8		デカドロン錠4mg内服	8 mg	内服	朝夕食後			●	●	●	

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
No.2	◆ エピルピシン塩酸塩注射液	90 mg/m2	≤900mg/m ² (累積)
No.3	◆ 注射用エンドキサン	600 mg/m2	

投与可能条件(初回)

検査値	基準
WBC	≥ 4000/mm ³
好中球	≥ 1500/mm ³
血小板	≥ 100,000/mm ³
Hb	≥ 9.0g/dL
T-Bill	≤ ULN × 1.5
AST・ALT	≤ ULN × 2.5
sCr	≤ ULN × 1.5
LVEF	55%以上

減量基準

検査値	基準	投与量
FN	≥ Grade3	25%減量
血小板減少	Grade4	25%減量
非血液毒性	≥ Grade3	25%減量