

診療グループ名
レジメンセット名称

乳がん(手術不能または再発・転移性)
105 Eribulin

投与規定

アントラサイクリン系及びタキサン系抗悪性腫瘍剤
含む化学療法の施行歴があること

インターバル日数 (21)日
レジメン基準日 day(1)

通しNo	癌	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2-7)	day(8)	day(9-21)
		大塚生食注	100 mL		ラインキープ用		●	休薬	●	休薬
No.1		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン①	5min	●		●	
	◆	ハラヴェン静注	1.4 mg/m ²				●		●	
No.2		大塚生食注	50 mL	静注	メイン②	全開	●		●	

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
No.1	◆ ハラヴェン静注	1.4 mg/m ²	

投与可能条件

検査値	基準
好中球数	≥ 1,000/mm ³
血小板数	≥ 75,000/mm ³
AST・ALT	≤ 5.0 × ULN
T-Bill	≤ 3.0 × ULN
非血液毒性	≤ Grade2

減量基準

検査値	基準
好中球数	< 500/mm ³
血小板数	< 25,000/mm ³
非血液毒性	≥ Grade3
その他の副作用	2週目に休薬した場合

減量の目安

1段階	1.1mg/m ²
2段階	0.7mg/m ²
3段階	中止考慮