

診療グループ名
レジメンセット名称

乳がん(手術不能または再発・転移性)
106 Bmab+PTX

投与規定

インターバル日数 (28)日
レジメン基準日 day(1)

通しNo	癌	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	器具	day(1)	day(2-7)	day(8)	day(9-14)	day(15)	day(16-28)
		大塚生食注	100 mL		ラインキープ用			●		●		●	
No.1		大塚生食注	100 mL		メイン①	90min(初回) 60min(2回目以降)		●				●	
	◆	アバステン静注	10 mg/kg					●				●	
No.2		大塚生食注	100 mL	点滴静注	メイン②	30min		●	休薬	●	休薬	●	休薬
		デキサート注射液	6.6 mg					●					
		ポララミン注5mg	5 mg					●					
		ファモチジン注射用20mg	20 mg					●					
No.3		大塚生食注	250 mL	点滴静注	メイン③	60min	0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルター-DEHPフリー	●		●		●	
	◆	パクリタキセル注	90 mg/m2										
No.4		大塚生食注	50 mL	静注	メイン④	全開		●		●		●	

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
No.2	◆ アバステン静注	10 mg/kg	
No.3	◆ パクリタキセル注	90 mg/m2	

投与可能条件

検査値	基準
好中球数	≥ 1,500/mm ³
血小板数	≥ 100,000/mm ³
T-Bill	≤ 1.5mg/dL
術後	28日経過後
高血圧	Grade3未満
蛋白尿	Grade2(2+ or 1g/日)未満
	※2回目以降は2+ or 2g/日以下

減量基準(PTX)

検査値	基準
好中球数	< 1500/mm ³
血小板数	< 100,000/mm ³
AST/ALT	≥ 5.0 × ULN
T-Bill	> 1.6mg/dL
末梢神経障	Grade3以上