

診療グループ名
レジメンセット名称

乳がん(HER2陽性)
107 HER+PER+DTX

投与規定

インターバル日数 (21)日
レジメン基準日 day(1)

通しNo	癌	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4-21)
		大塚生食注	100 mL		ラインキープ用		●			休薬
No.1		大塚生食注	250 mL	点滴静注	メイン①	60min(初回) 30min(2回目以降)	●			
	◆	パージェタ点滴静注	(初回)840 mg (2回目以降)420 mg				●			
No.2		大塚生食注	100 mL	点滴静注	メイン②	60min(初回) 30min(2回目以降)	●			
No.3		大塚生食注	250 mL	点滴静注	メイン③	90min(初回) 30min(2回目以降)	●			
	◆	トラスツマブ注射用	(初回)8 mg/kg (2回目以降)6 mg/kg				●			
No.4		大塚生食注	100 mL	点滴静注	メイン④	60min(初回) 30min(2回目以降)	●			
No.5		大塚生食注	100 mL	点滴静注	メイン⑤	30min	●			
		デキサート注射液	6.6 mg				●			
No.6		大塚糖液5%	250 mL	点滴静注	メイン⑥	60min	●			
	◆	ドセタキセル点滴静注用	75 mg/m2				●			
No.7		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン⑦	全開	●			
No.8		デカドロン錠4mg	8 mg	内服	朝夕食後		夕	朝夕	朝	

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
No.1	◆ パージェタ点滴静注	(初回)840 mg (2回目以降)420 mg	
No.3	◆ トラスツマブ注射用	(初回)8 mg/kg (2回目以降)6 mg/kg	
No.6	◆ ドセタキセル点滴静注用	75 mg/m2	

投与可能条件(初回)

検査値	基準
LVEF	≥50%
好中球数	≥1,500/mm ³
血小板数	≥100,000/mm ³
Hb	9.0g/dL
T-Bill	≤ULN
AST・ALT	≤ULN×2.5
sCr	≤2.0mg/dL

投与基準(HER・PER)

検査値	基準
LVEF	<40%or40~45%でベースから10%以上低下→3週間の延滞 3週間以内に再評価し上記条件を超えていれば再開

投与基準(DTX)

検査値	基準
好中球数	≥2000/mm ³
AST・ALT・ALP	AST・ALT ≤ULN×1.5かつALP ≤ULN×2.5
T-Bill	≤ULN