

診療グループ名
レジメンセット名称

前立腺がん
115 DTX

投与規定
インターバル日数 (21)日
レジメン基準日 day(1)

| 通しNo | 癌 | 薬品名・規格 | 投与量 | 手技 | 投与ルート | 点滴時間・速度 | day(1) | day(4-21) |
|------|---|--------------|----------|------|---------|---------|--------|-----------|
| | | 大塚生食注 | 100 mL | | ラインキープ用 | | ● | |
| No.1 | | 大塚生食注 | 100 mL | 点滴静注 | メイン① | 30min | ● | |
| | | デキサート注射液 | 6.6 mg | | | | ● | |
| No.2 | | 大塚糖液5% | 250 mL | 点滴静注 | メイン② | 60min | ● | |
| | | ◆ドセタキセル点滴静注用 | 75 mg/m2 | | | | ● | |
| No.3 | | 大塚生食注 | 50 mL | 点滴静注 | メイン③ | 全開 | ● | |
| No.4 | | プレドニゾロン錠 | 10 mg | 内服 | 朝夕食後 | | 朝夕 | 朝夕 |

上記表にて設定する抗がん剤について

| 通しNo | | 薬品名・規格 | 標準値 | 上限値 |
|------|---|-------------|----------|-----|
| No.2 | ◆ | ドセタキセル点滴静注用 | 75 mg/m2 | |

投与可能条件

| 検査値 | 基準 |
|------|--------------------------|
| 白血球数 | ≥ 3,000/mm ³ |
| 好中球数 | ≥ 2,000/mm ³ |
| 血小板数 | ≥ 50,000/mm ³ |
| Hb | ≥ 8g/dL |

減量基準

| 検査値 | 基準 |
|---------|----------|
| 血小板数 | Grade3以上 |
| 非血液学的毒性 | Grade3以上 |