

診療グループ名  
レジメンセット名称

胃がん

68 HER+SP

投与規定 PDになるまで

インターバル日数 (21)日  
レジメン基準日 day(1)

通しNo	癌	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5-14)	day(15)	day(16~21)		
		大塚生食注	100mL	点滴静注	ラインキープ用		●								
No.1		大塚生食注	250 mL	点滴静注	メイン①	90min(初回) 60min(2回目以降) ※30minまで短縮可	●								
		注射用水	40 mL				●								
	◆	トラスツズマブ注射用	(初回)8 mg/kg (2回目以降)6 mg/kg				●								
No.2		ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	メイン②	60min	●	●	●						
No.3		ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	メイン③	60min	●	●	●						
		硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	20 mL				●								
No.4		パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg	0.75 mg	点滴静注	メイン④ 開始時No.9アブレピタント服用	30min	●								
		デキサート注射液	9.9 mg				●								
No.5		大塚生食注	500 mL	点滴静注	メイン⑤	120min	●	●	●						
	◆	シスプラチン点滴静注 * 全量500mLとなるよう生食を抜く	60 mg/m2				●								
No.6		ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	メイン⑥	120min	●								
		フロセミド注20mg	1 A				●								
No.7		ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	メイン⑦	120min	●								
		プリンペラン注射液10mg	1 A				●								
No.8	◆	エスワン(後発品)(剤形は問わない) * 14日間服用後、7日間休薬	下記用量 参照	内服	1日2回 朝夕食後		夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝			
No.9		アブレピタントカプセル125mg内服	125 mg	内服	メイン④開始時服用		●								
No.10		アブレピタントカプセル80mg内服	80 mg	内服	朝食後			●	●						
No.11		デカドロン錠4mg内服	8 mg	内服	朝夕食後			●	●	●					

休薬

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
No.1	◆ トラスツズマブ注射用	(初回)8 mg/kg (2回目以降)6 mg/kg	
No.5	◆ シスプラチン点滴静注	60 mg/m2	
No.8	◆ エスワン(後発品)	右記用量 参照	75mg/回

投与可能条件(初回)

検査値	基準
Ccr	>60

減量基準

検査値	基準
Ccr	
30-60	50%減量
<30	中止

\* エスワン(後発品)は、体表面積に合わせ下記の基準量とする

体表面積	初回基準量(テガフル相当量)
1.25㎡未満	80mg/day
1.25㎡~ 1.5㎡未満	100mg/day
1.5㎡以上	120mg/day