

診療グループ名  
レジメンセット名称

肺がん(非小細胞肺がん)  
117 CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab(1~4クール目)

投与規定

インターバル日数 (21)日  
レジメン基準日 day( 1 )

通しNo	癌	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	day( 1 )	day( 2 )	day( 3 )	day( 4-7 )	day(8)	day(9-14)	day(15)	day(16-21)
		大塚生食注	100 mL	点滴静注	ラインキープ用		●				●		●	
No.1		生食100mL	100 mL	点滴静注	メイン①	30min	●							
		◆キイトルーダ点滴静注 *蛋白質透過型のインラインフィルター(0.2ミクロン)使用	200 mg/body				●							
No.2		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン②	全開	●							
No.3		大塚生食注	100 mL	点滴静注	メイン③	30min	●				●		●	
		グラニセロン静注用	3 mg				●							
		デキサート注射液	6.6 mg				●				●		●	
No.4		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン④	全開	●				●		●	
No.5		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン⑤	30min	●			休業	●	休業	●	休業
		◆アブラキサン点滴静注用 (1V辺り生食20mLで溶解)	100 mg/m2		フィルター使用不可		●							
No.6		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン⑥	全開	●				●		●	
No.7		大塚糖液5%	250 mL	点滴静注	メイン⑦	60min	●							
		◆カルボプラチン点滴静注液	AUC 6				●							
No.8		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン⑧	全開	●							
No.9		アブレピタントカプセル125mg内服	125 mg	内服	メイン③開始時服用		●							
No.10		アブレピタントカプセル80mg内服	80 mg	内服	朝食後			●	●					
No.11		デカドロン錠4mg内服	4 mg	内服	朝食後				●	●				

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
No.1	◆キイトルーダ点滴静注	200 mg/body	
No.5	◆アブラキサン点滴静注用	100 mg/m2	
No.7	◆カルボプラチン点滴静注液	AUC 6	

投与可能条件(初回時)

検査値	基準
neut	≥ 1500
Plt	≥ 100000
Hb	≥ 9.0
AST・ALT	≤ ULN × 2.5
T-bill	≤ 1.5
sCr	≤ 1.5

コース内投与基準

検査値	基準
neut	> 1000
Plt	≥ 50000
末梢神経障害	≤ Grade2