

診療グループ名
レジメンセット名称

肺がん(非小細胞肺がん)
117 CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab(5クール目~)

投与規定

インターバル日数 (21)日
レジメン基準日 day(1)

| 通しNo | 癌 | 薬品名・規格 | 投与量 | 手技 | 投与ルート | 点滴時間・速度 | day(1) | day(2-7) | day(8) | day(9-14) | day(15) | day(16-21) |
|------|---|--------------------------------|-------------|------|-----------|---------|----------|------------|--------|-----------|---------|------------|
| | | 大塚生食注 | 100 mL | 点滴静注 | ラインキープ用 | | ● | 休薬 | ● | 休薬 | ● | 休薬 |
| No.1 | | 生食100mL | 100 mL | 点滴静注 | メイン① | 30min | ● | | ● | | ● | |
| | ◆ | キイトルーダ点滴静注 | 200 mg/body | | | | ● | | | | | |
| | | * 蛋白質透過型のインラインフィルター(0.2ミクロン)使用 | | | | | | | | | | |
| No.2 | | 大塚生食注 | 50 mL | 点滴静注 | メイン② | 全開 | ● | | | | | |
| No.3 | | 大塚生食注 | 50 mL | 点滴静注 | メイン③ | 30min | ● | | ● | | ● | |
| | | グラニセトロン静注用 | 3 mg | | | | ● | | | | | |
| | | デキサート注射液 | 6.6 mg | | | | ● | | | | | |
| No.4 | | 大塚生食注 | 50 mL | 点滴静注 | メイン④ | 全開 | ● | | ● | | ● | |
| No.5 | | 大塚生食注 | 50 mL | 点滴静注 | メイン⑤ | 30min | ● | | ● | | ● | |
| | ◆ | アブラキサン点滴静注用 (1V辺り生食20mLで溶解) | 100 mg/m2 | | フィルター使用不可 | | ● | | ● | | ● | |
| No.6 | | 大塚生食注 | 50 mL | 点滴静注 | メイン⑥ | 全開 | ● | | ● | | ● | |

上記表にて設定する抗がん剤について

| 通しNo | 薬品名・規格 | 標準値 | 上限値 |
|------|---------------|-------------|-----|
| No.1 | ◆ キイトルーダ点滴静注 | 200 mg/body | |
| No.5 | ◆ アブラキサン点滴静注用 | 100 mg/m2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

投与可能条件(初回時)

| 検査値 | 基準 |
|---------|-------------|
| neut | ≥ 1500 |
| Plt | ≥ 100000 |
| Hb | ≥ 9.0 |
| AST・ALT | ≤ ULN × 2.5 |
| T-bill | ≤ 1.5 |
| sCr | ≤ 1.5 |

コース内投与基準

| 検査値 | 基準 |
|--------|----------|
| neut | > 1000 |
| Plt | ≥ 50000 |
| 末梢神経障害 | ≤ Grade2 |