

診療グループ名
レジメンセット名称

腎細胞がん
127 4weekly-Nivolumab+Cabozantinib(腎細胞がん)
根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

投与規定

インターバル日数 (28)日
レジメン基準日 day(1)

通しNo	癌	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2-28)
		大塚生食注	100 mL	点滴静注	ラインキープ用		●	休業
No.1		大塚生食注	100 mL	点滴静注	メイン①	30min	●	
	◆	オブジーボ点滴静注	480 mg/body				●	
		* 全量100mLで調製 * 蛋白質透過型のインラインフィルター(0.2ミクロン)使用						
No.2		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン②	全開	●	
No.3	◆	カボメティクス錠	40 mg	内服	空腹時		●	

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
No.1	◆ オブジーボ点滴静注	480 mg/body	
No.3	◆ カボメティクス錠	40 mg	

投与可能条件

検査値	基準
好中球数	≥ 1,500/μL
血小板数	≥ 100,000/μL
ヘモグロビン	≥ 9.0g/dL
総ビリルビン	≤ 1.5mg/dL
AST、ALT	≤ 100U/L
クレアチニン	≤ 1.5mg/dL
非血液毒性	Grade2以下

【カボメティクス減量の目安】

項目	減量の目安
AST、ALT	≤ 100U/L
ビリルビン	≤ 1.5mg/dL
上記以外の副作用	Grade2

減量時の投与量

	カボメティクス
通常	40mg
1段階	20mg
2段階	20mgを隔日