

診療グループ名
レジメンセット名称

腎細胞がん
131 3weekly-Pembrolizumab(腎細胞がん)
腎細胞癌における術後補助療法

投与規定 12か月間まで
インターバル日数 (21)日
レジメン基準日 day(1)

通しNo	癌	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2-21)
		生食100mL	100 mL	点滴静注	ラインキープ用		●	休薬
No.1		生食100mL	100 mL	点滴静注	メイン①	30min	●	
	◆	キイトルーダ点滴静注 * 蛋白質透過型のインラインフィルター(0.2ミクロン)使用	200 mg/body				●	
No.2		生食50mL	50 mL	点滴静注	メイン②	全開	●	

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
No.1	◆ キイトルーダ点滴静注	200 mg/body	

投与可能条件: 添付文書参照

検査値	基準
好中球数	≥ 1,500/μL
血小板数	≥ 100,000/μL
ヘモグロビン	≥ 9.0g/dL
総ビリルビン	≤ 1.5mg/dL
AST、ALT	≤ 100U/L
クレアチニン	≤ 1.5mg/dL
非血液毒性	Grade2以下

減量基準

検査値	基準
間質性肺疾患	G2以上
大腸炎	G2以上
AST、ALT	≥ 100U/L
クレアチニン	≥ 1.5mg/dL
下垂体炎	G2以上
甲状腺機能障害	G3以上
高血糖	G3以上