

診療グループ名
レジメンセット名称

腎細胞がん
134 6weekly-Pembrolizumab+Lenvatinib
根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

投与規定

インターバル日数 (42) 日
レジメン基準日 day(1)

通しNo	癌	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2-42)
		生食100mL	100 mL	点滴静注	ラインキープ用		●	休薬
No.1		生食100mL	100 mL	点滴静注	メイン①	30min	●	
	◆	キイトルーダ点滴静注 *蛋白質透過型のインラインフィルター(0.2ミクロン)使用	400 mg/body				●	
No.2		生食50mL	50 mL	点滴静注	メイン②	全開	●	
No.3	◆	レンビマカプセル	20 mg	内服	食後		●	

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
No.1	◆キイトルーダ点滴静注	400 mg/body	
No.3	◆レンビマカプセル	20 mg	

投与可能条件: 添付文書参照

検査値	基準
好中球数	≥1,500/μL
血小板数	≥100,000/μL
ヘモグロビン	≥9.0g/dL
総ビリルビン	≤1.5mg/dL
AST、ALT	≤100U/L
クレアチニン	≤1.5mg/dL
尿蛋白	尿蛋白1+以下
血圧	140/90mmHg以下
心機能検査	異常なし

減量基準: キイトルーダ

検査値	基準
間質性肺疾患	G2以上
大腸炎	G2以上
AST、ALT	≥100U/L
クレアチニン	≥1.5mg/dL
下垂体炎	G2以上
甲状腺機能障害	G3以上
高血糖	G3以上

レンビマの減量段階基準	投与量
1段階減量	14mg
2段階減量	10mg
3段階減量	8mg
4段階減量	4mg

減量基準: レンビマ

検査値	基準
血圧	収縮期160mmHg又は 拡張期100mmHg以上
その他 副作用	忍容性のないG2 G3以上