

診療グループ名 尿路上皮がん
 レジメンセット名称 119 GCBDCA(尿路上皮がん)

投与規定 PDまで
 インターバル日数 (21)日
 レジメン基準日 day(1)

通しNo	癌	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4-7)	day(8)	day(9-14)	day(15)	day(16-21)				
		大塚生食注	100 mL		ラインキープ用		●				●		●					
No.1		パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg	0.75 mg	点滴静注	メイン①	30min	●			休薬		休薬		休薬				
		デキサート注射液	3.3 mg		開始時No.7アプレピタント服用			●										
		ポララミン注5mg	1 A					●										
No.2		大塚生食注	100 mL	点滴静注	メイン②	30min	●											
	◆	ゲムシタピン点滴静注液	1000 mg/m2					●										
No.3		大塚生食注	250 mL	点滴静注	メイン③	60min	●											
	◆	カルボプラチン点滴静注液	AUC 5					●										
No.4		大塚生食注	100 mL	点滴静注	メイン④	30min					●		●		●	●	●	
		グラニセトロン静注液3mg	1 A															
		デキサート注射液	3.3 mg															
No.5		大塚生食注	100 mL	点滴静注	メイン⑤	30min					●		●		●	●	●	
	◆	ゲムシタピン点滴静注液	1000 mg/m2															
No.6		大塚生食注	50 mL	点滴静注	メイン⑥	全開	●						●			●		
No.7		アプレピタントカプセル125mg内服	125mg	内服	メイン①投与時		●											
No.8		アプレピタントカプセル80mg内服	80mg	内服	朝食後			●	●									
No.9		デカドロン錠4mg内服	4 mg	内服	朝食後			●	●									

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
No.2 ◆	ゲムシタピン点滴静注液	1000 mg/m2	
No.3 ◆	カルボプラチン点滴静注液	AUC 5	
No.5 ◆	ゲムシタピン点滴静注液	1000 mg/m2	

投与可能条件(初回)

検査値	基準
好中球	1,000/μl
血小板	100,000/μl