

診療グループ名
レジメンセット名称

胃がん
150 SOX + HER+Pembrolizumab

投与規定
インターバル日数 (21) 日
レジメン基準日 day(1)

通しNo	癌	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2-3)	day(4-14)	day(15)	day(16-21)
		生食100mL	100 mL		ラインキープ用		●				休業
No.1		生食100mL	100 mL	点滴静注	メイン①	30min	●				
	◆	キイトルーダ点滴静注	200 mg/body				●				
		* 蛋白質透過型のインラインフィルター(0.2ミクロン)使用									
No.2		生食250mL	250 mL	点滴静注	メイン②	90min(初回) 60min(2回目以降) ※30minまで短縮可	●				
		注射用水	40 mL				●				
	◆	トラスツズマブ注	(初回) 8 mg/kg				●				
		60mg:3mL, 150mg:7.2mLの注射用水で溶解(濃度:21mg/mL)	(2回目以降) 6 mg/kg								
No.3		生食100mL	100 mL	点滴静注	メイン③	30min	●				
		グラニセトン静注液3mg	3 mg		開始時No.6アプレビタント服用		●				
		デキサート注射液	3.3 mg				●				
		ボラミン注5mg	5 mg				●				
No.4		大塚糖液5%500mL	500 mL	点滴静注	メイン④	120min	●				
	◆	オキサリプラチン点滴静注液	100 mg/m2				●				
		*全量500mLとなるように調製									
No.5		生食50mL	50 mL	静注	メイン⑤	15min	●				
No.6	◆	エスワン(後発品)(剤形は問わない)	(投与量は下表を参照)	内服	朝夕食後		夕	朝夕	朝夕	朝	
		* 14日間服用後、7日間休業									
No.7		アプレビタントカプセル125mg内服	125 mg	内服	メイン②開始時服用		●				
No.8		アプレビタントカプセル80mg内服	80 mg	内服	朝食後			●			
No.9		デカドロン錠4mg内服	4 mg	内服	朝食後			●			

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
No.1	◆ キイトルーダ点滴静注	200 mg/body	
No.2	◆ トラスツズマブ注	(初回) 8 mg/kg	
		(2回目以降) 6 mg/kg	
No.4	◆ オキサリプラチン点滴静注液	100 mg/m2	
No.6	◆ エスワン(後発品)(剤形は問わない)	80 mg/m2/day	

投与可能条件(初回)

検査値	基準
好中球	1,500以上
血小板	75,000以上
心エコー	心機能の評価の結果、総合的に判断し投与の可否を検討す

エスワン(後発品)用量(1日量)

体表面積(m2)	用量(mg/日)
1.25未満	80
1.25以上1.5未満	100
1.5以上	120